

## FICHA TÉCNICA



### DESCRIPCIÓN

**ENGOR FRUT EXTRA PS®** es un nutrinductor en presentación de polvo concentrado soluble, diseñado especialmente para estimular la floración, el desarrollo y la maduración de los frutos y tubérculos, garantizando una mejor consistencia, calidad y tamaño de la cosecha.

Gracias a su excelente balance nutricional y fitohormonal, **ENGOR FRUT EXTRA PS®** promueve la división celular y activa la rápida movilización de nutrientes desde la raíz hasta el crecimiento de los frutos en la planta. Esto se traduce en una mejora de los rendimientos en peso específico, un color homogéneo y una mayor calidad de los productos cosechados. **ENGOR FRUT EXTRA PS®** coadyuva y promueve la floración de manera efectiva.



**ENGOR FRUT EXTRA PS®** es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color: s/c  
Apariencia:  
Solubilidad:  
PH:  
Densidad:  
Cristalización:

**ENGOR FRUT®**  
**XTRA PS**



#### PRESENTACIÓN

1 Kg, 3 Kg y 5 Kg

#### REGISTRO

RSCO 061/II/23

### GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Citoquininas                             | 500 ppm     |
| Manitol                                  | 500 ppm     |
| Gibberalinas                             | 200 ppm     |
| Auxinas                                  | 100 ppm     |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 40%         |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 5%          |
| Aminoácidos totales                      | 5%          |
| Azufre                                   | 1%          |
| Ácido glutámico                          | 1%          |
| Magnesio                                 | 0.50%       |
| Zinc                                     | 0.50%       |
| Boro                                     | 0.50%       |
| Hierro                                   | 0.32%       |
| Calcio                                   | 0.32%       |
| Extractos naturales y carriers           | 45.73%      |
| <b>Total</b>                             | <b>100%</b> |



*Pasión por innovar y nutrir tu cultivo.*

[www.nutriline.mx](http://www.nutriline.mx)



## FICHA TÉCNICA

### MECANISMOS DE ACCIÓN

**ENGOR FRUT XTRA®** es un nutrinductor para la etapa de fructificación con una alta concentración de hormonas, manitol, aminoácidos y nutrientes esenciales como Potasio. La formulación de **ENGORFRUT XTRA®** está potenciado con L-aminoácidos, oligoelementos y además extractos de origen orgánico, proporciona múltiples beneficios en el desarrollo y rendimiento de las plantas; es idóneo para ser aplicado en las etapas de máxima-demanda de potasio, especialmente durante la formación y la maduración de los frutos. Actúa iniciando el proceso de engorde y maduración del fruto. El potasio influye sobre la síntesis de carbohidratos, regula el transporte del agua en la planta y mejora la respiración. Estas acciones se traducen a nivel de la planta en: mayor resistencia a condiciones adversas de frío y sequía, agrupación de la producción, mejora de la turgencia de las hojas en especies como tabaco y ornamentales y en cuanto al fruto proporciona: mayores calibres, mejor consistencia, coloración más intensa y adelanto de la madurez.

### RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO                          | ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO                                                       | DOSIS L/Ha |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alfalfa                          | Aplicar a los 15 días después del corte.                                                     | 3 a 4      |
| Algodón                          | Utilizar en la etapa previa al papaloteo, y continuar con aplicaciones cada 15 a 20 días.    | 3 a 4      |
| Aguacate                         | Aplicar en la etapa de amarres, cuaje y fructificación en intervalos de 22 a 30 días.        | 2 a 4      |
| Cafeto                           | Hacer aplicaciones desde floración hasta la fructificación.                                  | 3 a 5      |
| Cile y tomate                    | Aplicar a los 45 días del transplante y repetir cada 15 días durante la etapa de producción. | 2 a 4      |
| Papa                             | Durante la floración y el resto del ciclo del cultivo. Realizar 3 foliadas.                  | 2 a 3      |
| Garbanzo, Soya, Frijol, Chicharo | Apartir de los 45 días de nacidas y en producción (vaina verde).                             | 2 a 4      |
| Fresa ,Zarzamora                 | A partir de la floración y durante el período de producción. En intervalos de 8 a 15 días.   | 2 a 3      |
| Frutales                         | Hacer de 4 a 6 aplicaciones durante la etapa de floración y producción.                      | 2 a 4      |
| Maíz, Sorgo                      | Realizar 2 aplicaciones: Durante la floración y producción o jiloteo.                        | 3 a 5      |
| Pepino, Melón, Sandía, Calabaza  | A partir de los 45 días de nacida, repetir cada 15 días durante el ciclo de producción.      | 2 a 4      |
| Papaya                           | Aplicar cada 45 días, durante la etapa productiva.                                           | 2 a 4      |
| Trigo, Arroz, Cebada             | Realizar 2 aplicaciones: floración, amacollamiento y llenado de grano.                       | 1 a 3      |
| Piña                             | Previo a la inducción floral realizar de 4 a 5 foliadas.                                     | 3 a 5      |
| Plátano                          | Aplicar cada 45 días durante el periodo o ciclo productivo.                                  | 3 a 5      |