

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

ENGOR FRUT EXTRA PS® es un nutrinductor en presentación de polvo concentrado soluble, diseñado especialmente para estimular la floración, el desarrollo y la maduración de los frutos y tubérculos, garantizando una mejor consistencia, calidad y tamaño de la cosecha.

Gracias a su excelente balance nutricional y fitohormonal, **ENGOR FRUT EXTRA PS®** promueve la división celular y activa la rápida movilización de nutrientes desde la raíz hasta el crecimiento de los frutos en la planta. Esto se traduce en una mejora de los rendimientos en peso específico, un color homogéneo y una mayor calidad de los productos cosechados. **ENGOR FRUT EXTRA PS®** coadyuva y promueve la floración de manera efectiva.



ENGOR FRUT EXTRA PS® es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Blanco
Apariencia:	Polvo
Solubilidad:	100 %
PH:	5.52
Densidad:	1.15 g/mL
Cristalización:	n/a

ENGOR FRUT®
XTRA PS



PRESENTACIÓN

1 Kg, 3 Kg y 5 Kg

REGISTRO

RSCO 061/II/23

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Citoquininas	500 ppm
Manitol	500 ppm
Giberelinas	200 ppm
Auxinas	100 ppm
Potasio (K ₂ O)	40%
Fósforo (P ₂ O ₅)	5%
Aminoácidos totales	5%
Azufre (S)	1%
Ácido glutámico	1%
Magnesio (Mg)	0.50%
Zinc (Zn)	0.50%
Boro (B)	0.50%
Hierro (Fe)	0.32%
Calcio (Ca)	0.32%
Extractos naturales y carriers	45.73%
Total	100%



FICHA TÉCNICA

MECANISMOS DE ACCIÓN

ENGOR FRUT XTRA[®] es un nutrinductor para la etapa de fructificación con una alta concentración de hormonas,manitol,aminoácidos y nutrientes esenciales como Potasio. La formulación de **ENGORFRUT XTRA[®]** está potenciado con L-aminoácidos, oligoelementos y además extractos de origen orgánico, proporciona múltiples beneficios en el desarrollo y rendimiento de las plantas; es idóneo para ser aplicado en las etapas de máxima-demanda de potasio, especialmente durante la formación y la maduración de los frutos. Actúa iniciando el proceso de engorde y maduración del fruto. El potasio influye sobre la síntesis de carbohidratos, regula el transporte del agua en la planta y mejora la respiración. Estas acciones se traducen a nivel de la planta en: mayor resistencia a condiciones adversas de frío y sequía, agrupación de la producción, mejora de la turgencia de las hojas en especies como tabaco y ornamentales y en cuanto al fruto proporciona: mayores calibres, mejor consistencia, coloración más intensa y adelanto de la madurez.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS Kg/Ha
Alfalfa	Aplicar a los 15 días después del corte.	0.5 a 1
Algodón	Utilizar en la etapa previa al papaloteo, y continuar con aplicaciones cada 15 a 20 días.	1 a 2
Aguacate	Aplicar en la etapa de amarres, cuaje y fructificación en intervalos de 22 a 30 días.	2 a 4
Cafeto	Hacer aplicaciones desde floración hasta la fructificación.	2 a 3
Chile y tomate	Aplicar a los 45 días del trasplante y repetir cada 15 días durante la etapa de producción.	1 a 2
Papa	Durante la floración y el resto del ciclo del cultivo. Realizar 3 foliadas.	2 a 3
Garbanzo, Soya, Frijol, Chicharo	Apartir de los 45 días de nacidas y en producción (vaina verde).	2 a 3
Fresa ,Zarzamora	A partir de la floración y durante el período de producción. En intervalos de 8 a 15 días.	1 a 2
Frutales	Hacer de 4 a 6 aplicaciones durante la etapa de floración y producción.	2 a 4
Maíz,Sorgo	Realizar 2 aplicaciones: Durante la floración y producción o jiloteo.	2 a 4
Pepino, Melón, Sandía,Calabaza	A partir de los 45 días de nacida, repetir cada 15 días durante el ciclo de producción.	2 a 3
Papaya	Aplicar cada 45 días, durante la etapa productiva.	2 a 4
Trigo, Arroz, Cebada	Realizar 2 aplicaciones: floración, amacollamiento y llenado de grano.	2 a 4
Piña	Previo a la inducción floral realizar de 4 a 5 foliadas.	2 a 4
Plátano	Aplicar cada 45 días durante el periodo o ciclo productivo.	2 a 4