

FICHA TÉCNICA

NUTRILINE®

FITOBIOTIC K BS®

DESCRIPCIÓN

FITOBIOTIC K BS® es una formulación avanzada desarrollada con tecnología NutriTec Development®, que integra fosfito de potasio y ácido acetilsalicílico para fortalecer la sanidad vegetal y mejorar la respuesta del cultivo ante condiciones de estrés.

NutriTec Development®

FITOBIOTIC K BS® es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.



PRESENTACIÓN

1L, 5L y 20L

REGISTRO

RSCO 085/II/26

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Fosfito de potasio	99%
Ácido acetilsalicílico	1000 ppb

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Café oscuro
Apariencia:	Líquido
Solubilidad:	100%
pH:	4-5
Densidad:	1.45-1.50 g/mL



FITOBIOTIC K BS®

FICHA TÉCNICA

MECANISMOS DE ACCIÓN

La acción sistémica de **FITOBIOTIC K BS®** activa los mecanismos naturales de defensa de la planta, promoviendo la producción de compuestos antimicrobianos y favoreciendo la tolerancia frente a patógenos y factores abióticos. Al mismo tiempo, estimula el desarrollo radicular, mejora la absorción de nutrientes y optimiza el equilibrio fisiológico del cultivo.

Gracias a su alta movilidad y rápida asimilación, **FITOBIOTIC K BS®** actúa de manera integral desde la raíz hasta los órganos aéreos, favoreciendo la recuperación, el crecimiento equilibrado y un mayor rendimiento productivo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS mL / 1000 L
Agave azul	En campo, aplicar sobre el follaje iniciado el temporal cada 30 días, con mínimo 2 aplicaciones. Dosis bajas en plantas de 0 a 3 años y dosis altas en plantas de 4 años a	300 – 500
Aguacate	Aplicar desde prefloración a cosecha, repetir cada 30 días.	150 – 250
Ajo, cebolla	Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días hasta término; en el último mes, las aplicaciones son semanales.	200 – 300
Alfalfa, forrajes y pasto	A los 12 días después de cada corte o pastoreo.	250 – 300
Algodón	Aplicar antes del papaloteo y después, a intervalos de 21 a 30 días.	250 – 300
Brócoli,coliflor, col, lechuga, espinaca, zanahoria	Aplicar desde 25 días del trasplante y durante todo el ciclo, a intervalos de 15 a 30 días.	200 – 300
Cafeto, cítricos, ciruelo, durazno, mango, nogal, guayabo, manzano	Aplicar desde prefloración y durante la cosecha cada 30 días, hasta la salida del cultivo.	200 – 300
Caña de azúcar	Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.	200 – 300
Flores de corte	Desde brotación hasta el corte de la flor, en intervalos de 15 a 20 días.	200 – 300
Árandano, fresa,vid frambuesa y zarzamora	Desde brotación hasta el corte de la flor, en intervalos de 15 a 20 días.	200 – 300
Avena, cebada, trigo, sorgo, maíz	Aplicar desde prefloración y durante la cosecha cada 30 días, o según se considere	200 – 300
Chile,melón, calabaza, espárrago, sandía, pepino, tomate	Aplicar desde prefloración a cosecha, repetir cada 15 a 30 días. Realizar aplicaciones	200 – 300
Chícharo, cacahuate, frijol, grabanzo,haba, soya	Desde 25 días de brotada la planta, aplicar a intervalos de 30 días.	200 – 300
Papa	Aplicar desde los 21 días de brotada la planta, en intervalos de 8 a 15 días.	200 – 300
Papayo	Aplicar desde prefloración, repetir cada 15 días hasta la salida del cultivo. Realizar	200 – 300
Plátano	Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.	200 – 300
Piña	Aplicar desde el inicio de desarrollo cada 30 días. A partir de la inducción, realizar	300 – 400