

FICHA TÉCNICA



NUTRILINE®
Agro Science

DESCRIPCIÓN

FULL Sili-K TF® es un nutrinductor líquido foliar, su fórmula contiene una excelente combinación de silicio y potasio, enriquecida con elementos menores quelatados y carriers orgánicos. Es ideal para las etapas de crecimiento y maduración de frutos.

Su composición fortalece de manera excepcional la pared celular en los tejidos de la planta y los frutos, aportando resiliencia, mayor peso específico y una vida de anaquel prolongada. Como resultado, mejora tanto la cantidad como la calidad durante la etapa de fructificación.



FULL Sili-K TF® es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

S/C

S/C



FULL Sili-K®_{TF}



PRESENTACIÓN

1L, 5L y 20L

REGISTRO

RSCO 589/XI/23

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Citoquininas	100 ppm
Potasio (K ₂ O)	15%
Silicio	10%
Quelatos orgánicos	2%
Manitol	0.1%
Extractos naturales, carriers y nutrientes	72.99%
Total	100%



Pasión por innovar y nutrir tu cultivo.

www.nutriline.mx



FICHA TÉCNICA

MECANISMOS DE ACCIÓN

S/C

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS L/Ha
Alfalfa	Aplicar a los 15 días después del corte.	3 a 4
Algodón	Utilizar en la etapa previa al papaloteo, y continuar con aplicaciones cada 15 a 20 días.	3 a 4
Aguacate	Aplicar en la etapa de amarres, cuaje y fructificación en intervalos de 22 a 30 días.	2 a 4
Cafeto	Hacer aplicaciones desde floración hasta la fructificación.	3 a 5
Cile y tomate	Aplicar a los 45 días del trasplante y repetir cada 15 días durante la etapa de producción.	2 a 4
Papa	Durante la floración y el resto del ciclo del cultivo. Realizar 3 foliadas.	2 a 3
Garbanzo, Soya, Frijol, Chicharo	Apartir de los 45 días de nacidas y en producción (vaina verde).	2 a 4
Fresa ,Zarzamora	A partir de la floración y durante el período de producción. En intervalos de 8 a 15 días.	2 a 3
Frutales	Hacer de 4 a 6 aplicaciones durante la etapa de floración y producción.	2 a 4
Maiz,Sorgo	Realizar 2 aplicaciones: Durante la floración y producción o jiloteo.	3 a 5
Pepino, Melón, Sandía, Calbaza	A partir de los 45 días de nacida, repetir cada 15 días durante el ciclo de producción.	2 a 4
Papaya	Aplicar cada 45 días, durante la etapa productiva.	2 a 4
Trigo, Arroz, Cebada	Realizar 2 aplicaciones: floración, amacollamiento y llenado de grano.	1 a 3
Piña	Previo a la inducción floral realizar de 4 a 5 foliadas.	3 a 5
Plátano	Aplicar cada 45 días durante el periodo o ciclo productivo.	3 a 5