

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

HORMOLIFE XTRA TF® es un innovador biorregulador de crecimiento y maduración de frutos, compuesto por un alto contenido de citocininas y un balance de giberelinas, auxinas y carriers orgánicos, enriquecido con enzimas, vitaminas y activos bioestimulantes que promueven la etapa de crecimiento y maduración de frutos en los cultivos, dando como resultado cantidad y calidad de rendimientos en la cosecha.



HORMOLIFE XTRA TF® es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**.

Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Negro
Apariencia:	Líquido
Solubilidad:	100%
PH:	5.9
Densidad:	1.1



PRESENTACIÓN

250ML, 1L, 5L y 20L

REGISTRO

RSCO 599/XI/23

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Citoquininas	4300 ppm
Auxinas	400 ppm
Giberelinas	400 ppm
Manitol	2000 ppm
Aminoácidos totales	4%
Ácido glutámico	5%
Ácido algínico	3%
Extractos naturales, carriers y nutrientes	87.29%
Total	100%

FICHA TÉCNICA



MECANISMOS DE ACCIÓN

Formulado con moléculas altamente biorreactivas que promueven el desarrollo, **HORMOLIFE XTRA TF®** estimula eventos fisiológicos específicos, tales como el aumento del tamaño y la uniformidad del fruto, mejora del vigor de los brotes laterales y retraso de la senescencia. La precisión y el equilibrio de los compuestos hormonales requieren una aplicación en momentos de alta sensibilidad para maximizar la respuesta deseada.

Con su acción biorreguladora, **HORMOLIFE XTRA TF®** interviene en procesos clave de la planta como la división celular, el aumento del tamaño del fruto, la estimulación de brotes, el incremento en los grados Brix y la mejora de las características internas y consistencia de los frutos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS
Acelga, Apio, Brócoli, Col de Brúcelas, Cilantro, Coliflor, Espinacas, Lechuga, Repollo	Al haber 2 o 5 pares de hojas y 10 - 15 días después.	450-500 ml / Ha
Aguacatero, Mango, Mandarino, Naranja, Pomelo, Toronjo	Dos semanas después de inicio de la floración y hasta la caída de pétalos.	450-500 ml / Ha
Alfalfa	Aplicar cuando la planta tenga 10-15 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada corte.	450-500 ml / Ha
Algodonero	Inicio de cuadreo y 3-4 semanas después.	500 ml / Ha
Banano	Inicio de cuadreo y 3-4 semanas después.	200 ml cada mes
Berenjena, Cucurbitáceas, Chile, Leguminosas, Tomate	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutillos.	450-500 ml / Ha
Betabel, Camote, Papa	Al inicio de la floración del tubérculo y repetir a los 15-30 días.	500 ml / Ha
Caña de azúcar	Cuando la planta tenga 40-50 cm de altura.	500 ml / Ha
Cereales y granos	Al inicio del amacollamiento. Al segundo nudo de maíz y sorgo.	450-500 ml / Ha
Fresas	Al inicio de floración y repetir cada 3-4 semanas.	450-500 ml / Ha
Frutales, Caducifóleos	Cada 30 días, durante su producción.	1L/1,000L de agua
Limonero	Durante la floración y hasta la caída de pétalos.	500 ml/Ha
Ornamentales	A los 10-20 cm de altura y 3-4 semanas después.	100 ml / 100 L de agua
Papayo	Iniciar aplicaciones al comenzar la floración.	250 ml / 100 L de agua
Piña	A los 30-40 días del trasplante y repetir a los 60-90 días.	250 ml / 100 L de agua
	Después de la caída de pétalos, repetir cada 21 días.	1.5 L / Ha
Plátano	En siembras nuevas iniciar aplicaciones a los 40 días de la emergencia de las plantas.	250 ml / Ha cada 60 días
Tabaco	A los 35-45 días del trasplante y repetir si el capado fue "alto".	500 ml / Ha
Vid (uva con semilla)	Al inicio de la floración y 3-4 semanas después.	21 L ml / 1000 L de agua
Vid (uva sin semilla)	Al inicio, a 50 y 80% de la floración. Cuarta cuando las bayas tengan 6-8 mm, quinta 5 días después y sexta a otros 5 días.	750 ml / 1000 L de agua
Berries	Al inicio del crecimiento vegetativo, braseo y floración.	500 ml / 1000 L de agua