

FICHA TÉCNICA



NUTRILINE®
Agro Science

DESCRIPCIÓN

HYDRO FRUT QUALITY® es un nutrisoluble de alta eficiencia formulado con tecnología **NutriTec Development®**. Contiene una elevada concentración de potasio, fósforo, y silicio ofrece un balance adecuado de calcio, zinc, boro y aminoácidos, todos en forma quelatada. Además, incluye activos que protegen su fórmula en rangos extremos de pH.

Recomendado durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto, **HYDRO FRUT QUALITY®** desempeña funciones nutricionales esenciales en las plantas. Su alta concentración de macro y microelementos promueve el desarrollo de frutos desde la etapa de cuajado, crecimiento y maduración de fruto.



NutriTec Development®

HYDRO FRUT QUALITY® es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development®**. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Rojo - rosa
Apariencia:	Polvo - Cristales solubles
Solubilidad:	100 %
pH:	5.58
Densidad:	1.46



HYDRO FRUT QUALITY®



PRESENTACIÓN

25Kg y 20Kg

REGISTRO

RSCO 382/VIII/24

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Citoquininas	100 ppm
Potasio (K ₂ O)	42%
Fósforo (P ₂ O ₅)	7%
Silicio (Si)	1%
Calcio (Ca)	1%
Zinc (Zn)	0.10%
Boro (B)	0.10%
Aminoácidos totales	0.10%
Extractos naturales y carriers	48.69%
Total	100%



Pasión por innovar y nutrir tu cultivo.

www.nutriline.mx



FICHA TÉCNICA

MECANISMOS DE ACCIÓN

HYDRO FRUT QUALITY® es un nutrisoluble de alta eficiencia cuya fórmula está diseñada para usarse en la etapa final o de fructificación de los cultivos para promover y asegurar la mayor consistencia, cantidad, calidad y tamaño de frutos durante su etapa productiva. Su balance fósforo-potasio se encuentra enriquecida con elementos menores y quelatada con L-aminoácidos lo cual eficiente y trasloca de manera más rápida y efectiva los nutrientes en la planta.

Su alta concentración de potasio, el cual interviene en la formación de carbohidratos, influencia la síntesis de proteínas, activa e induce la producción de enzimas, ayuda a regular la transpiración e incrementa la resistencia de las plantas al ataque de patógenos e insectos.

BENEFICIOS NUTRICIONALES AL CULTIVO CON FRUTÓN GROWTH®

Fósforo, fortalece el desarrollo radicular, promueve y estimula la formación de botones en flores y de frutillas en árboles, evita el fenómeno del "aborto" o abscisión que es la caída prematura de flores y frutos.

El Potasio interviene en la formación de carbohidratos, influencia la síntesis de proteínas, activa e induce la producción de enzimas, ayuda a regular la transpiración e incrementa la resistencia de las plantas al ataque de patógenos e insectos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS Kg/Ha	CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS Kg/Ha
Alfalfa	Aplicar de los 4 a los 8 días después de cada corte.	20-25	Frutales	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Algodón	Utilizar al deshijar, en el papaloteo y cuando esta en bellota.	20-25	Maíz, Sorgo	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Aguacate	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50	Sandía, Melón, Pepino, Calabaza	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Cafeto	Aplicar durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	20-25	Papaya	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Tomate, Berenjena, Chile	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50	Trigo, Arroz, Cebada	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	20-25
Papa	Aplicar durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50	Piña	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Garbanza, Soya, Frijol, Chicharo	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	20-25	Plátano	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50
Fresa, Zarzamora	Aplicar a partir de la etapa de cuajado y durante la etapa de crecimiento y maduración del fruto.	25-50			