

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

STIMFLOWER TF[®] es un nutrinductor para prefloración y floración en forma líquida concentrado. Su avanzada formulación a base de fitohormonas, fósforo, micronutrientes esenciales, energizantes y reductores de nitratos promueven e inducen a la etapa fenológica de prefloración y floración en las plantas.

 **STIMFLOWER TF**[®] es una innovadora formulación elaborada con la tecnología **NutriTec Development**[®]. Diseñada para desencadenar la máxima bioefectividad en las plantas, esta fórmula garantiza resultados excepcionales y consistentes. Eleva el rendimiento y la vitalidad de tus cultivos a niveles extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Café oscuro
Apariencia:	Líquido
Solubilidad:	100%
pH:	6
Densidad:	1.15

STIMFLOWER[®] **TF**



PRESENTACIÓN

1 L, 5 L y 20 L

REGISTRO

RSCO 055/II/24

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Auxinas	1000 ppm
Fósforo (P ₂ O ₅)	24%
Aminoácidos totales	4%
Zinc	1%
Boro	1%
Extractos naturales y nutrientes	69.90%
Total	100%

FICHA TÉCNICA

MECANISMOS DE ACCIÓN

STIMFLOWER TF[®], es un nutrinductor para prefloración y floración en forma líquida concentrado, fortalece el tubo polínico y todo el proceso enzimático y reproductivo de esta etapa fenológica. Esto resulta en una mayor cantidad de cuaje y amarre en los cultivos, lo que a su vez se traduce en una mayor calidad y cantidad de frutos por planta, de acuerdo a su potencial genético.

STIMFLOWER TF[®] se aplica por aspersión en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje, utilizando de 200 a 800 litros de agua por hectárea para aplicaciones terrestres y de 40 a 80 litros de agua por hectárea para aplicaciones aéreas.

STIMFLOWER TF[®] no muestra incompatibilidad con la mayoría de los agroquímicos de

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS L/Ha
Acelga, Ajo, Brocoli, Cebolla, Coles, Espinaca, Lechuga	Al haber 2 - 5 pares de hojas y 10 - 15 días después.	1 - 2
Aguacatero, Mango, Mandarino, Naranja, Pomelo, Toronjo	Dos semanas después del inicio de la floración y hasta la caída de pétalos.	1 - 2
Alfalfa	Aplicar cuando la planta tenga 10-15 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada corte	1 - 2
Algodonero	Inicio de cuajado y 3-4 semanas después.	1 - 2
Banano	En siembras nuevas iniciar aplicaciones a los 40 días de la emergencia de las plantas.	1 - 2
Berenjena, Chile, Cucurbitáceas, Tomate, Leguminosas	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutillos.	1 - 2
Betabel, Camote, Papaya	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutillos.	1 - 2
Caña de azúcar	Cuando la planta tenga 40-50 cm de altura.	1 - 2
Cereales y Granos	Al inicio del amacollamiento. Al segundo nudo de maíz y sorgo.	1 - 2

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y MÉTODO DE EMPLEO	DOSIS L/Ha
Fresa	Al inicio de la floración y repetir cada 3 o 4 semanas.	1 - 2
Frutales, Caducifóleos	Durante la floración y hasta la caída de pétalos.	1 - 2
Limonero	Cada 30 días, durante su producción.	1 - 2
Ornamentales	A los 10-20 cm de altura y 3-4 semanas después.	1 - 2
Papayo	Iniciar aplicaciones al comenzar a floración.	1 - 2
Piña	Aplicar cada 45 días durante el periodo o ciclo productivo.	1 - 2
Berries	Después de la caída de pétalos, repetir cada 21 días.	1 - 2
Plátano	En siembras nuevas iniciar aplicaciones a los 40 días de la emergencia de las plantas.	1 - 2
Abaco	A los 35-45 días del trasplante y repetir si el capado fue "alto".	1 - 2
Vid (uva con semilla)	Al inicio de la floración y 3-4 semanas después.	1 - 2
Vid (uva con semilla)	Al inicio, a 50 y 80% de la floración. Cuarta cuando las bayas tengan 6-8 mm, quinta 5 días después y sexta a otros 5 días.	1 - 2